

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP -9-3-67 621733

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE RENNES (Tél. 40-00-74)

(CALVADOS, COTES-DU-NORD, FINISTÈRE, ILLE-ET-VILAINE, MANCHE, MAYENNE, MORBIHAN, ORNE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Route de Fougères - RENNES, (face à l'Hippodrome)
C. C. P. : RENNES 9.404-94

ABONNEMENT ANNUEL

~~15 F~~

25 F

Supplément n° 1 au Bulletin n° 78

8 MARS 1967

INFORMATIONS

OIGNONS ET POIREAUX

MOUCHE DE L'OIGNON -

La lutte chimique contre cet insecte peut être réalisée de diverses façons :

- par enrobage de la semence (méthode la plus économique)
- par trempage des plants avant repiquage
- par traitement du sol (méthode la plus onéreuse)

Tous ces traitements assurent une protection satisfaisante pendant trois à quatre mois. Mais, après ce délai, en année de forte pullulation, il est prudent d'envisager une ou deux pulvérisations complémentaires afin d'éviter les attaques tardives (employer une spécialité pour pulvérisation, contenant l'une des matières actives préconisées ci-après).

Traitement de la semence - (enrobage à sec seulement)

Utiliser une poudre contenant l'un des produits suivants :

Semis dense (1 kg de graines à 1'are)

Diéthion	:	60	gr	de	matière	active	par	kg	de	semence
Carbophénothion	:	60	gr	"	"	"	"	"	"	"
Diazinon	:	40	gr	"	"	"	"	"	"	"
Trichloronate	:	40	gr	"	"	"	"	"	"	"

Semis clair : Même quantité par kg de graines, mais il convient d'apporter dans la raie de semis le complément d'insecticide nécessaire pour que la dose utilisée à 1'are corresponde bien à celle employée dans le cas de semis dense.

P. 178

Trempage des plants avant repiquage dans une bouillie contenant 50 gr de Diéthion pour 10 l. d'eau (employer une spécialité en poudre).

Traitement du sol avant mise en place de la culture -

- | | | | |
|-------------------|----------|-------------------|-------------|
| - Diéthion | : 5 kg | de matière active | à l'hectare |
| - Carbophénothion | : 5 kg | " | " |
| - Diazinon | : 8 kg | " | " |
| - Trichloronate | : 2,5 kg | " | " |

Enfouir superficiellement aussitôt après traitement.

Ces quatre insecticides ont sensiblement la même efficacité; faire son choix en fonction du prix le plus intéressant.

CHARBON DE L'OIGNON -

Pour éviter cette affection, effectuer, avant traitement des graines contre la Mouche, un premier enrobage avec une spécialité à base de Thirame (80 gr de M.A. par kg de graines).

Sur graines de poireau, il vaut mieux éviter ce traitement car la germination peut s'en trouver diminuée.

POMMES DE TERRE DE PRIMEUR

MILDIOU -

Cette maladie se développe souvent à partir de repousses qui apparaissent sur les tas de déchets de triage placés parfois à proximité des cultures.

Pour éviter ce risque, il est recommandé de détruire ces repousses soit par un défanant, soit par de la chaux vive.

SAULES PLEUREURS

ANTHRACNOSE -

Cette maladie provoque des taches sur feuilles et des chancres sur rameaux. Pour lutter contre cette affection, effectuer une pulvérisation à base de Manèbe dès la formation des jeunes feuilles. Prévoir deux autres applications à 15 jours d'intervalle.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles,
F. BARBOTIN et G. PAITIER

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux,
J. DELOUSTAL.